

# پھلوں کے باغات میں کھادوں کی سفارشات

(مقدار: کلوگرام فی پودا سالانہ)

پھل	مرحل	گوبرگی گلی سڑی کھاد	سونایوریا	سونا ڈی اے پی	ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی	کھادوں کا طریقہ استعمال
ایوکیڈو (کھن پھل)	پودے لگاتے وقت	10 تا 12	—	—	—	پھلدار پودوں کو ہر سال دسمبر، جنوری میں فی پودا گوبرگی ساری کھاد ڈالیں۔ کیسیائی کھادوں میں تمام سونا ڈی اے پی اور ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی ایم او پی اور نصف سونا پوریا پھول آنے سے قبل جبکہ بقیہ سونا پوریا پھل بننے پر استعمال کریں۔
	پھل دار پودے	30 تا 40	1½	1½	1	
جاپانی پھل (پیمین)	پودے لگاتے وقت	10 تا 12	—	—	—	گوبرگی کھاد دسمبر میں دیں۔ پھل دینے والے پودوں کو تمام سونا ڈی اے پی اور ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی ایم او پی اور نصف سونا پوریا پھول آنے سے قبل اور بقیہ سونا پوریا جب پھل مڑنے کے دانے کے برابر ہو جائے تو استعمال کریں۔
	پھل دار پودے	40	2 تا 2½	1 تا 1½	1 تا 1½	
ناریل	پودے لگاتے وقت	8 تا 10	—	—	—	گوبرگی کھاد دسمبر میں دیں۔ پھل دار پودوں کو سونا پوریا، سونا ڈی اے پی، ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی ایم او پی اور نصف سونا پوریا پھول آنے سے پہلے اور پھل بننے پر دیں۔
	پھل دار پودے	50	¾	1	¾	
بیر	پودے لگاتے وقت	8 تا 10	—	—	—	گوبرگی کھاد دسمبر میں ڈالیں۔ تمام ڈی اے پی، ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی ایم او پی اور نصف سونا پوریا پھول آنے سے قبل اور بقیہ سونا پوریا جب پھل مڑنے کے دانے کے برابر ہو جائے تو ڈالیں۔
	پھل دار پودے	40 تا 50	1½ تا 2	1 تا 1½	1 تا 1½	
شہتوت	پودے لگاتے وقت	8 تا 10	—	—	—	گوبرگی کھاد دسمبر میں ہر دوسرے سال استعمال کریں۔ سونا پوریا، سونا ڈی اے پی، ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی ایم او پی اور نصف سونا پوریا پھول آنے سے دو ہفتے پہلے اور بقیہ سونا پوریا پھل بننے کے بعد ڈالیں۔
	پھل دار پودے	20	1 تا 2	½ تا 1	¾ تا 1	
چیکو	پودے لگاتے وقت	10 تا 12	—	—	—	گوبرگی کھاد دسمبر میں استعمال کریں۔ تمام سونا ڈی اے پی، ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی ایم او پی اور نصف سونا پوریا پھول آنے سے دو ہفتے پہلے اور بقیہ سونا پوریا پھل بننے کے بعد ڈالیں۔
	پھل دار پودے	20	½ تا ¾	¼ تا ½	¾	
ناشپاتی	پودے لگاتے وقت	10 تا 15	—	—	—	گوبرگی گلی سڑی کھاد کے ساتھ سونا ڈی اے پی، ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی ایم او پی دسمبر میں ڈالیں، جبکہ سونا پوریا کی نصف مقدار پھول آنے سے 15 سے 20 دن قبل اور بقیہ آدھی مقدار پھل بننے کے بعد دیں۔
	پھل دار پودے	20 تا 30	1 تا 2½	1 تا 1½	1 تا 1½	
زیتون	پھل نہ دینے والے پودے	20 تا 25	1	¾	½	گوبرگی گلی سڑی کھاد کے ساتھ سونا ڈی اے پی، ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی ایم او پی کی سفارش کردہ تمام مقدار آخر دسمبر میں ڈالیں، جبکہ سونا پوریا دو برابر اقساط میں پھول آنے کے وقت اور پھل مڑنے کے دانے کے برابر ہو جائے تو استعمال کریں۔
	پھل دار پودے	25 تا 30	2	1 تا 1½	¾	

**نوٹ:** ● کھادوں کا استعمال تجزیہ زمین کے مطابق کریں۔ ● گوبرگی کھاد ہمیشہ اچھی طرح گلی سڑی استعمال کریں۔ ● دسی اور کیسیائی کھادوں کو تنے سے 1 تا 1½ فٹ چھوڑ کر پودے کی چھتری کے نیچے ڈال کر زمین میں اچھی طرح ملا دیں۔ ● کھادوں کے استعمال کے بعد فوراً آبپاشی کریں تاکہ یہ پانی میں حل ہو کر پودوں کو دستیاب ہو جائیں۔ ● زنک اور بوران کی کمی دور کرنے کے لیے 7½ کلوگرام سونا زنک اور 3 کلوگرام سونا بوران فی ایکڑ گوبرگی کھاد کے ساتھ ملا کر استعمال کریں۔

● نئے پودے لگانا: ● اپنے علاقائی موسم کے مطابق پودے لگانے سے 1½ سے 2 ماہ پہلے جگہ کی نشاندہی کرنے کے بعد تین فٹ گہرے اور تین فٹ چوڑے گڑھے کھودیں ● گڑھے کھودتے وقت اوپر کی ایک فٹ تک مٹی کو ایک طرف اور باقی نیچے دو فٹ والی مٹی علیحدہ رکھیں۔ ● گڑھوں کو 15 سے 20 دن کے لیے کھلا چھوڑ دیں تاکہ دھوپ سے نقصان نہ کیڑے مرجائیں۔ ● اوپر کی ایک فٹ والی مٹی میں ایک حصہ پھل اور ایک حصہ گلی سڑی گوبرگی کھاد ملا کر گڑھوں کو بھر کر پانی لگا دیں۔ وتر آنے پر پودوں کو ان میں منتقل کریں۔



فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ



# پھلوں کے باغات میں کھادوں کی سفارشات

(مقدار: کلوگرام فی پودا سالانہ)

پھل	مرحل	گوبرگی گلی سڑی کھاد	سوناپوریا	سونا ڈی اے پی	ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی ایم او پی	کھادوں کا طریقہ استعمال
آڑو	پودے لگاتے وقت	10 تا 15	$\frac{1}{4}$	—	—	سونا ڈی اے پی، ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی ایم او پی اور گوبرگی گلی سڑی کھاد دسمبر میں جبکہ سونا پوریا کی نصف مقدار پھول آنے سے 2 ہفتے پہلے اور باقی نصف مقدار پھل بننے کے 2 ہفتے بعد ڈالیں۔
	پھل دار پودے	40 تا 50	$\frac{1}{2}$ تا $\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$ تا $\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	
انگور	پودے لگاتے وقت	15 تا 20	—	—	—	گوبرگی کھاد دسمبر میں ڈالیں۔ وسط مارچ میں تمام سونا ڈی اے پی و نصف سونا پوریا اور نصف ایف ایف سی ایس او پی یا ایم او پی ڈالیں۔ جبکہ بقیہ سونا پوریا اور ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی ایم او پی دانے بننے کے بعد ڈالیں۔
	پھل دار پودے	20 تا 30	$\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	
آلو بخارا	پودے لگاتے وقت	15 تا 20	—	—	—	گوبرگی کھاد، سونا ڈی اے پی اور ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی ایم او پی دسمبر میں ڈالیں۔ جبکہ سونا پوریا اور برہنہ پھول نکلتے سے قبل اور پھل بننے وقت ڈالیں۔
	پھل دار پودے	40 تا 60	$\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ تا $\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{2}$	
خوبانی	پودے لگاتے وقت	10 تا 15	—	—	—	پھل دار پودوں کو گوبرگی کھاد دسمبر جبکہ سونا پوریا، سونا ڈی اے پی اور ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی ایم او پی کی نصف مقدار پھول آنے سے قبل اور بقیہ مقدار پھل بننے پر ڈالیں۔
	پھل دار پودے	30 تا 40	$\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ تا $\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{2}$	
پلیچی	پودے لگاتے وقت	8 تا 10	—	—	—	جوان پودوں کو دسمبر میں گوبرگی کھاد کے ساتھ سونا ڈی اے پی اور ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی ایم او پی کی ساری مقدار ڈال دیں۔ سونا پوریا کی نصف مقدار پھول آنے سے 2 ہفتے پہلے اور باقی سونا پوریا پھل بننے پر ڈالیں۔
	پھل دار پودے	10 تا 20	3 تا 4	$1\frac{1}{4}$ تا $1\frac{1}{2}$	1 تا 2	$\frac{3}{4}$ تا $1\frac{1}{4}$
انار	پودے لگاتے وقت	10 تا 15	—	—	—	گوبرگی کھاد دسمبر میں دیں جبکہ سونا پوریا، سونا ڈی اے پی اور ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی ایم او پی دو برابر حصوں میں پھول آنے سے قبل اور پھل بننے کے بعد دیں۔
	پھل دار پودے	25 تا 35	$\frac{1}{2}$ تا $\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
فالسہ	پھل دار پودے	10 تا 15	$\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{2}$	فالسہ کے پودوں کو گوبرگی کھاد سردیوں میں شاخ تراشی کے بعد دیں جبکہ سونا پوریا، سونا ڈی اے پی اور ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی ایم او پی بھوٹ شروع ہونے سے پہلے استعمال کریں۔
لوکاٹ	چھوٹے پودے	10 تا 15	—	—	—	گوبرگی کھاد پھول آنے سے پہلے اگست یا ستمبر میں دیں جبکہ سونا پوریا، سونا ڈی اے پی اور ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی ایم او پی کی نصف مقدار ستمبر اور باقی نصف مقدار فروری اور مارچ میں دیں۔
	پھل دار پودے	20 تا 50	$\frac{3}{4}$ تا 1	$1\frac{1}{4}$ تا $1\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{4}$
پیتا	پودے لگاتے وقت	10 تا 12	—	—	—	موسم برسات میں گوبرگی گلی سڑی کھاد استعمال کریں۔ سونا پوریا کی نصف مقدار، سونا ڈی اے پی اور ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی ایم او پی کی تمام مقدار پھول آنے سے پہلے تقریباً دو ہفتے قبل ڈالی جائے جبکہ سونا پوریا کی باقی نصف مقدار پھل بن جانے کے بعد ڈالیں۔
	پھل دار پودے	20 تا 30	$\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
سٹرابیری	—	10 تا 12 ٹرائی فی ایکڑ	$2\frac{3}{4}$ بوری فی ایکڑ	2 بوری فی ایکڑ	2 بوری فی ایکڑ	گوبرگی گلی سڑی کھاد ستمبر، اکتوبر میں ڈال کر زمین میں ملادیں۔ سونا ڈی اے پی اور ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی ایم او پی کی تمام مقدار اور سونا پوریا کی نصف مقدار زمین کی تیاری کرتے وقت ڈالیں جبکہ باقی سونا پوریا پھول آنے پر دیں۔



فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ

