


# امرود



فوجی فہرٹائلز کمپنی لمیٹڈ



ہیلپ لائن برائے کاشتکاران



0800-00332

کسان کا ساتھ، نبھانے  
فصل کو سونا بنانے



مارکیٹنگ گروپ: لاہور ٹریڈ سنٹر، شارع ایوان صنعت و تجارت، لاہور

☎ 042-36369137-40 🌐 www.ffc.com.pk

گو براؤر بھائی کھاد میں ہنے سے ایک فٹ دور شاخوں کی پھتری کے نیچے ڈالیں۔ اجڑائے صغیرہ کی کمی کی صورت میں 3 کلوگرام سونا پوران اور 7 کلوگرام سونا زنگ فی ایکڑ استعمال کریں۔

## کیٹروں اور بیماریوں کا تدارک

امروڈ کے پھل کو سب سے زیادہ نقصان پھل کی کھسی سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی کیڑے مثلاً گلیبیوری، ہنے کاگزرواں، دیمک وغیرہ اس پر حملہ آور ہو کر نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کے تدارک کیلئے ایف ایف سی کے زرعی ماہرین سے مشورہ کریں۔

### امروڈ کا سرجماد

یہ بیماری پودوں کی بڑوں کو متاثر کرتی ہے نشوونما رک جاتی ہے اور پودا آہستہ آہستہ سوکھ جاتا ہے۔ اس بیماری کے انسداد کے لیے ضروری ہے کہ متاثرہ پودے کی بڑوں اور شاخوں کا پھینکاؤ جیٹیل لیبارٹری سے تجزیہ کرایا جائے اور پھپھوندی کی قسم کے مطابق پھپھوندی کش ادویات کا استعمال کیا جائے۔

### امروڈ کا سوکا

یہ بیماری اکثر امروڈ کے باغات میں پائی جاتی ہے۔ اس بیماری سے متاثرہ شاخیں چوٹی سے نیچے کی طرف سوکھنا شروع ہوجاتی ہیں۔ کاشتکاران میں بے احتیاطی اور موسم گرما میں پھل کو غیر مناسب طریقہ سے برداشت کرنا اس بیماری کی بڑی وجوہات ہیں۔ متاثرہ پودوں پر سوکھی ہوئی شاخیں نظر آتی ہیں۔ سوکھی اور متاثرہ شاخوں کو 6 انچ چھچھے سبز حصے سے کاٹ دیں اور ناچن ایم 2.5 گرام یا فوئیو گولڈ ایک ملی لیٹر فی لٹر پانی میں حل کر کے پھرے کریں۔

## برداشت

امروڈ سال میں دو دفعہ بار آور ہوتا ہے ایک موسم گرما (جولائی اگست) اور دوسری دفعہ پھل موسم سرما (جنوری فروری) میں بار آور ہوتا ہے۔ موسم گرما کی فصل کی کوٹائی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا پھل توڑنے کے فوراً بعد نوکریوں میں ڈال کر منڈیوں میں لے جائیں۔ پکا ہوا پھل ہفتہ میں دو سے تین بار توڑیں۔

## کاشتکاروں کے نام اہم پیغام

پانی کے محدود ذخائر کہیں ہماری لاپرواہیوں کی نذر نہ ہو جائیں اس قیمتی دولت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔



# امروہ کی کاشت

امروہ پاکستان میں ترشاوہ پھل اور آم کے بعد رقبہ اور پیداوار کے لحاظ سے تیسرا بڑا پھل ہے۔ یہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں اگایا جاتا ہے۔ غذائی اعتبار سے امروہ کو وٹامن سی کا بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے 100 گرام پھل میں 280 ملی گرام وٹامن سی کے علاوہ وٹامن اے، فاسفورس، چونا اور فولاد بھی پایا جاتا ہے۔ امروہ سال میں دو مرتبہ بار آور ہوتا ہے۔ ایک فصل موسم گرما (جولائی اگست) اور دوسری موسم سرما (جنوری فروری) میں حاصل ہوتی ہے۔ پاکستان میں امروہ زیادہ تر پھل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی اوسط پیداوار تقریباً 100 من فی ایکڑ سالانہ ہے جو پیداواری صلاحیت سے بہت کم ہے ہمارے ہاں ترقی پسند کاشتکار امروہ کی سالانہ 200 سے 250 من فی ایکڑ تک پیداوار حاصل کر رہے ہیں جو کئی اوسط سے تقریباً دو گنا زیادہ ہے۔ اگر دیگر کاشتکار بھی امروہ کے باغات کی نگہداشت اور پیداواری امور پر توجہ دیں تو وہ بھی امروہ کے باغات سے کثیر منافع حاصل کر سکتے ہیں پاکستان میں امروہ کی کل پیداوار کا 20 تا 40 فیصد حصہ بعد از برداشت کے مراحل میں ضائع ہو جاتا ہے۔ لہذا باغات کی نگہداشت کے ساتھ ساتھ پھل کے بعد از مراحل پر بھرپور توجہ انتہائی ضروری ہے اس ضمن میں کاشتکار درج ذیل سفارشات پر عمل پیرا ہو کر امروہ کے باغات سے بھرپور اور اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔

## آب و ہوا اور زمین

امروہ کی منافع بخش پیداوار کیلئے گرم مطوب و نیم گرم معتدل آب و ہوا جہاں درجہ حرارت 23 سے 28 درجہ سینٹی گریڈ رہے موزوں تصور کی جاتی ہے۔ تاہم اس کا درخت سخت جان ہے اور یہ پختہ علاقوں میں بھی اگایا جاسکتا ہے۔ مگر نیم گرم مطوب آب و ہوا میں یہ خوب پرورش پاتا ہے۔ امروہ بھاری بھاری سے رتیلی میرا زمینوں میں کامیابی سے اگایا جاسکتا ہے تاہم اعلیٰ درجہ کی زیادہ پیداوار کیلئے بہتر کاس والی میرا زمین موزوں تصور کی جاتی ہے۔ یہ نیم پختہ زوہ زمینوں میں بھی اگایا جاسکتا ہے۔ یعنی دیگر پھلوں کی نسبت یہ قدرے کھلمی زمینوں میں بھی نشوونما پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

## ترقی دادہ اقسام اور پودوں کی منتقلی

امروہ کی زیادہ تر اقسام کا نام گودے، پھل یا علاقے کو مدنظر رکھ کر رکھا جاتا ہے۔ ان میں سفیدہ، چنی دار، حصی، کر بلا، سید لیس، اللہ آباد، شریواری گولا، سرخا، اہل کلر وغیرہ اقسام زیادہ کاشت کی جاتی ہیں۔ امروہ کے تیار پودوں کو فروری، مارچ یا اگست، ستمبر میں کھیت میں منتقل کیا جاتا ہے۔ کھیت میں پودے لگانے سے قبل 6 تا 8

میٹر کے فاصلے 1x1x1 میٹر کے گہرے گڑھے کھودے جائیں۔ ان گڑھوں کو کچھ حصہ کیلئے کھلا چھوڑ دیں۔ پھر ان میں ایک حصہ پھل ایک حصہ گوبر کی گلی سڑی کھاد اور ایک حصہ گڑھے کے اوپر والی مٹی کو اچھی طرح ملائیں اور ان میں ایک مٹی مٹی سونا ڈی اے پی، سونا یوریا اور ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی ایم او پی ملا کر پانی لگائیں۔ وتر آنے پر گوڈی کر کے پودے کو گڑھے کے درمیان لگا کر مٹی ڈال دیں اور پھر تنے کے ساتھ چاروں طرف تھوڑی سی مٹی چڑھا کر پانی لگادیں۔ اگر پودوں کا قد زیادہ ہو تو جڑوں اور شاخوں میں تو از ان برقرار رکھنے کیلئے شاخوں کا اوپر کا حصہ کاٹ دیں۔ آج کل ہائی ڈینسٹی پلانٹنگ کا طریقہ رواج پکڑ رہا ہے جس میں فی ایکڑ پودوں کی تعداد اور اپنی کاشت کی نسبت کئی گنا زیادہ رکھی جاتی ہے زیادہ تر زمیندار اس طریقہ کار کی پیروی کرتے ہوئے ایک ایکڑ میں پودوں کی تعداد 400 سے 500 تک رکھ رہے ہیں۔ خیال رہے کہ ہائی ڈینسٹی پلانٹنگ میں باغ کی کامیابی اور زیادہ پیداوار کا انحصار بروقت اور باقاعدہ شاخ تراشی پر ہے۔

## شاخ تراشی و گوڈی

امروہ کے پودوں کی شاخ تراشی عموماً کم ہوتی ہے لیکن پودے کے ڈھانچے کو سنوارنے اور انہیں مضبوط بنانے کیلئے چھوٹی عمر میں کٹ چھانٹ کر دیں۔ بہت زیادہ چھکی ہوئی شاخوں کے سرے کاٹ دیں۔ تنے پر پختہ حصہ میں نکلنے والی چھوٹی چھوٹی شاخوں کو بھی کاٹ دیں۔ گرمیوں کی فصل پر پھل کی کمی کا مملہ زیادہ ہوتا ہے جس سے پھل جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات پھلوں کی چھدرائی یا جھاڑنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ فصل کی برداشت کے بعد سوکھی، پیارا اور کمزور شاخوں کو کاٹ دیں۔

## جڑی بوٹیوں کا انسداد

امروہ کے باغات کو جڑی بوٹیوں سے بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ کیونکہ پودوں کی خوراک جذب کرنے والی زیادہ تر جڑیں زمین کی سطح کے قریب ہوتی ہیں جو جڑی بوٹیوں کی وجہ سے صحیح خوراک جذب نہیں کر سکتیں علاوہ ازیں یہ جڑی بوٹیاں نقصان دہ کیڑوں اور بیماریوں کی آماجگاہ بھی ہیں۔ لہذا امروہ کے باغات خاص کر پودے کے نیچے چھتری والے حصہ کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ تاکہ جو کھادیں زمین میں ڈالی جائیں جڑیں انہیں آسانی سے استعمال کر سکیں۔

## آپاشی

چھوٹے پودوں کو سارا سال کم پانی جبکہ پھل دار پودوں کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم پھلوں کے وقت آپاشی روک دیں تاکہ بار آور یا اچھی طرح ہو سکے۔ بڑے پودوں کو گرمی کے موسم میں 10 دن کے وقفے سے جبکہ سردیوں میں 25 دنوں کے وقفوں سے آپاشی موسم، زمین اور آب و ہوا کو مدنظر رکھتے ہوئے کریں۔ سخت سردی اور کورے میں پودوں کو پانی لگانے سے باج کورے کے مضر اثرات سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے۔

## کھادوں کا متوازن استعمال

امروہ کے باغ سے اچھی کوالٹی کی بھرپور پیداوار لینے کیلئے ضروری ہے کہ زمین کا تجزیہ کروا کر کھادوں کے متوازن استعمال کو پودے کی عمر کے مطابق یقینی بنایا جائے۔ اس ضمن میں آپ فوجی فریڈائزنگ مینیجمنٹ کی جدید کمپیوٹرائزڈ لیبارٹریوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ زمین کا تجزیہ نہ کروائیں تو درج ذیل عمومی سفارشات کے مطابق کھادوں کا استعمال کریں:

## کھادوں کی سفارشات (کلوگرام فی پودا سالانہ)

پودے کی عمر	گوبر کی کھاد	سونا یوریا	ڈی اے پی سونا	ایف ایف سی ایس او پی یا ایم او پی ایف ایف سی
1 سال	20	125 (گرام)	-	-
2 سال	20	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	-
3 سال	30	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
4 سال	40	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$
5 سال اور اس سے زائد	50	1	1	$\frac{3}{4}$

**طریقہ استعمال:** گوبر کی گلی سڑی کھاد دسمبر میں پودوں کی چھتری کے نیچے ڈال کر گوڈی کریں اور پانی لگا دیں جبکہ دیگر کیہائی کھادیں دو اقساط میں پھل توڑنے کے بعد اور سردیوں کے پھل آنے سے قبل (اگست ستمبر) ڈالیں۔ تمام

